

Ileus

NOTFALL

Synonym: **Darmverschluss**

<u>Definition</u>	<ul style="list-style-type: none">- gestörte Dünn-/Dickdarmpassage des Speisebreis/Darminhalts- man unterscheidet einen mechanischen von einem paralytischen Ileus – wobei jeder unbehandelte, mechanische Ileus aufgrund neurologischer Automatismen irgendwann automatisch zu einem paralytischen Ileus wird- als mechanischer Ileus wird ein Ileus bezeichnet, der aufgrund eines mechanischen Passagehindernisses des Speisebreis entweder innerhalb des Darms z.B. infolge von Darmkrebs oder durch Druck auf den Darm von außen z.B. infolge von Traumen (Verletzungen) entstanden ist- als paralytischer Ileus wird ein Ileus bezeichnet, der aufgrund nervaler/neurol. Mechanismen zu einer Darmlähmung (=Paralyse) also einem Ausfall der Darmmotorik und somit dem Transport des Darminhalts führt	
<u>Häufige Lokalisation</u>		
<u>Risikofaktoren</u>	n.b.	
<u>Ätiologie</u>	paralytischer Ileus <ul style="list-style-type: none">- schwere intraabdominelle Entzündungen- reflektorisch z.B. n. OP, Verletzungen- metabolisch (Stoffwechsellentgleisungen starke E'lytstörungen)- vaskulär (z.B. Mesenterialinfarkt)- medikamentös (z.B. Opiate, Anticholinergika)- als Folge des mechanischen Ileus- spastischer Ileus (spastische Darmwandkontraktionen)- infektiös/toxisch z.B. Wurmbefall / Bleivergiftung	mechanischer Ileus <u>Obstruktionen:</u> <ul style="list-style-type: none">- intraluminal: Tumoren, Fremdkörper, Steine, Entzündungen- extraluminal: Briden, Adhäsionen, Hernien, Tumoren u.a. <u>Strangulationen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Inkarceration (Abschnürung) von Darmsegmenten, Hernien, Volvulus , Invagination
<u>Klinik</u>	paralytischer Ileus <ul style="list-style-type: none">- Metorismus, Stuhl-/Windverhalt- „Kot“ Erbrechen (Überlauf von Magen-Darminhalt) - Miserere- verfallenes Aussehen & tief liegende Augen- Singultus (Schluckauf)	mechanischer Ileus Akutes Abdomen <ul style="list-style-type: none">- starke kolikartige Abdominal-Schmerzen- Stuhl-/Windverhalt- Ü, E, Meteorismus- Abwehrspannung der Bauchdecke- Miserere (Kot-Erbrechen)- Fieber, Tachykardie
<u>Labor</u>	- je nach Ursache	
<u>Untersuchungszeichen</u>	Auskultation: Totenstille im Abdomen nur das Ticken der Totenuhr (= Puls im Abdomen)	Auskultation: vor der Stenose Hyperperistaltik, spritzig-hell klingende metallische Geräusche – hinter der Stenose herrscht Stille
<u>Komplikationen</u>	<ul style="list-style-type: none">- Exsikkose (Flüssigkeitsverlust)- Perforation → Sepsis / Peritonitis → Schock	
<u>DD</u>	- andere Ursachen für eine akutes Abdomen	
<u>sonstiges</u>	- die Passagestörung kann entweder vollständig (=Ileus) oder noch unvollständig ausgeprägt sein (=Subileus)	

